

Abies chengii RUSHFORTH

Englisch Cheng fir
Deutsch Chengs-Tanne

Verbreitung:

Nur in der Provinz Yunnan beheimatet.

Genetische Differenzierung:

RUSHFORTH führt die *A. chengii* als eigenständige Art. Inwieweit es sich hier um eine eigenständige Art handelt, muss sicher weiter geprüft werden.

Möglicherweise ist sie in den Verwandtschaftskreis von *A. forrestii* einzubeziehen. LIU führt diese Art auch nicht als Synonym.

Bemerkungen:

Die hier wachsende Tanne stammt direkt von RUSHFORTH, England. Nach seinen Angaben kommt sie aus der Kollektion von Forrest aus dem Jahr 1931.

Weiterführende Literatur:

RUSHFORTH (1983) und(1987);

Örtliche Erfahrungen:

Die hier stehende *A. chengii* hat in ihren bis jetzt erkennbaren Merkmalen eine auffallende Ähnlichkeit mit einer ebenfalls im Arboretum befindlichen *A. salouenensis*. Diese wiederum wird von LIU als Synonym unter *A. chensiensis* var. *chensiensis* geführt.

Ihre taxonomische Stellung und ihre eventuelle Eignung für eine Pflanzung im Freien müssen weiter geprüft werden.