

Abies coahuilensis JOHNSTON

Synonym: *A. durangensis* var. *coahuilensis* (JOHNSTON) MARTINEZ

Englisch Coahuilan fir
Deutsch Coahuila-Tanne

Verbreitung:

Nur im Westen der mexikanischen Provinz Coahuila in einem begrenzten Gebiet.

Genetische Differenzierung:

Die Tanne wird von DALLIMORE et JACKSON und von RUSHFORTH als eigenständige Art geführt, von MARTINEZ, LIU und GAUSSEN als Varietät von *A. durangensis*.

Bemerkungen:

Die Tannenart unterscheidet sich – abgesehen von der deutlich anderen geographischen Lage ihres Verbreitungsgebietes—in allen spezifischen Artmerkmalen nur wenig von der *A. durangensis*.

Am Naturstandort wächst sie zusammen mit *Pinus ayacahuite* var. *brachyptera*, *Pseudotsuga menziesii* und *Cupressus* in tiefen, nach Norden ausgerichteten Gebirgstälern.

Weiterführende Literatur:

MARTINEZ (1963); LIU (1971); DALLIMORE et JACKSON (1966); RUSHFORTH (1987); GAUSSEN (1966);

Örtliche Erfahrungen:

Die ersten Versuche der Auspflanzung von *A. coahuilensis* lassen noch keine Beurteilung zu. Es kann jedoch vermutet werden, dass die Art unter günstigen Klima- und Standortsbedingungen bedingt winterhart ist