

Abies magnifica MURRAY

Synonym: *A. nobilis* var. *magnifica* MAST.

Englisch	California Red fir
Deutsch	Pracht-Tanne

Verbreitung:

Sie ist in den küstennahen Gebirgen von Oregon und Kalifornien in Höhenlagen von 1500 bis 3500 m über NN verbreitet.

Genetische Differenzierung:

LIU unterscheidet mit der *A. x shastensis* LEMM. emend. LIU eine Artkreuzung zwischen *A. procera* und *A. magnifica*.

Bemerkungen:

Diese Tannenart ist gegenüber ihrer nahen Verwandten *A. procera* ausgesprochen selten in Parkanlagen und Botanischen Gärten zu finden. Zu gutem Wachstum stellt die Art die gleichen Bedingungen wie *A. procera*.

Weiterführende Literatur:

LIU (1971); DALLIMORE et JACKSON (1966); SCHENCK (1939); SCHÜTT et al. (1999);

Örtliche Erfahrungen:

Die örtlichen Erfahrungen stützen sich auf nur wenige Exemplare, so dass keine abschließende Aussage gemacht werden kann. Es kann aber angenommen werden, dass sie sich ähnlich wie die *A. procera* verhalten wird. Von der *A. procera* kann diese Tanne durch die im Querschnitt rhombischen Nadeln; durch die nicht gefurchte Nadeloberseite; durch Stomata auf allen vier Seiten und durch eine graugrüne Farbe derselben unterschieden werden. Die Pracht-Tanne macht ihrem Namen alle Ehre. Eine weitere Verbreitung ist ihr zu wünschen.